


Considerare

- Condizioni cliniche generali
- Valutazione oggettiva e soggettiva, tipo di lesione
- Intensità del dolore tramite scale
- Recente uso di analgesici
- Eventuali controindicazioni a farmaci (età, allergie, asma, patologia d'organo ecc...)



Analgesico	Dosaggio
Paracetamolo	OS: carico: 20 mg/kg (0-6 mesi); 30 mg/kg (>6 mesi) Poi: 0-6mesi 20 mg/kg ogni 8h (MAX 60mg/kg/die); 6-12 mesi 10-20 mg/kg ogni 4-6h (MAX 60mg/kg/die); >12 mesi 10-15 mg/kg ogni 4-6h (MAX 75 mg/kg/die, 90 mg/kg/die >6 anni) EV: carico in 15 minuti: 7.5 mg/kg (<10Kg); 15 mg/kg (>10Kg) Poi 10-15 mg/kg ogni 4-6h (MAX 30mg/kg/die <10 kg; 60mg/kg/die >10kg) ER: carico 30 mg/kg (0-6 mesi); 35-45 mg/kg (>6 mesi) Poi: 0-6 mesi 15mg/kg ogni 8h; >6 mesi 15-20 mg/kg ogni 4-6h (MAX come per OS)
Ibuprofene	OS: 10-12mg/kg/dose ogni 6-8h (MAX 50 mg/kg/die)
Naprossene	OS: 7.5-10 mg/kg/dose ogni 12 h (MAX 20mg/kg/die)
Indometacina	OS ed EV: 1mg/kg ogni 8h (MAX 3mg/kg/die)
Ketorolac (Toradol)	OS ed EV: 0,5mg/kg ogni 6-8h (MAX 3mg/kg/die) NB solo > 16 anni
Tramadolo (Contramal)	OS: 0,5-1 mg/kg ogni 4-6 ore EV: Bolo 1-2 mg/kg da ripetere max 3 volte/24h Infusione continua 0,3 mg/kg/h NB Dose max giornaliera comprensiva di boli e infusione = 6 mg/Kg
Morfina(*)	EV: Bolo 0,05-0,1 mg/kg ogni 2-4h Infusione continua 0,02-0,03 mg/kg/h In casi gravi (es. neoplasie) 1-2 mg/kg/dose
Codeina(**)	OS o ER: 0,5-1 mg/kg ogni 4-6 ore (associata a paracetamolo) NB solo >12 anni

(*) In caso di sovradosaggio Naloxone 0.01 mg/Kg EV ripetuto alla dose di 0.1mg/Kg in assenza di risposta. Se SC o IM dosi frazionate

(**) Attenzione: NO se interventi ORL, NO se patologia respiratoria, NO se allattamento, NO se metabolizzatore rapido